

Seminis®

• CEBULA

• MARCHEW

• POR





MONSANTO POLSKA SP. Z O.O.
BIURO HANDLOWE SEMINIS:
UL. DYWIZJONU 303 NR 169
01-470 WARSZAWA
TEL: (022) 638 25 86
FAX: (022) 638 25 22
www.seminis.com.pl

DYREKTOR HANDLOWY:

JACOB BLOKKER
tel. (022) 638 59 96
tel. kom. 664 142 942
e-mail: jacob.blokker@seminis.com

REGIONALNI MENEDŻEROWIE HANDLOWI:

Polska północna

RADOSŁAW GRABOWSKI
tel. kom. 664 143 543
e-mail: radoslaw.grabowski@seminis.com

Polska południowa

tel. (022) 638 25 86

Polska wschodnia i centralna

tel. (022) 638 25 86

Polska zachodnia

TOMASZ WESOŁOWSKI
tel. kom. 664 196 396
e-mail: tomasz.wesolowski@seminis.com

TERMINOLOGIA UŻYTA W KATALOGU

ODPORNOŚĆ WYSOKA/STANDARDOWA (HR)

Zdolność odmiany określonej rośliny do ograniczenia w wysokim stopniu wzrostu i rozwoju danego szkodnika lub patogenu i/lub ograniczenia zaistnienia szkody, którą te szkodniki i patogeny wyrządzają na roślinach odmian wrażliwych, będących w podobnych warunkach środowiska i przy podobnym nasileniu danego szkodnika lub patogenu. Odmiany z wysoką odpornością w warunkach bardzo silnej presji szkodnika lub patogenu mogą wykazywać niewielkie objawy uszkodzeń lub infekcji.

ODPORNOŚĆ UMIARKOWANA (IR)

Zdolność odmiany określonej rośliny do ograniczenia wzrostu i rozwoju danego szkodnika lub patogenu, przy czym odmiana ta może wykazać większy zakres symptomów infekcji lub uszkodzeń w porównaniu do odmian z odpornością wysoką. Odmiany z umiarkowaną odpornością wykazują jednak mniej dotkliwe oznaki choroby lub uszkodzenia niż odmiany wrażliwe, uprawiane w podobnych warunkach środowiska i/lub przy podobnym nasileniu danego szkodnika lub patogenu.

TOLERANCJA

Zdolność roślin danej odmiany do przetrwania stresu abiotycznego (powodowanego przez czynniki nie ożywione), bez poważnego wpływu na wzrost, wygląd oraz plon. Seminis nie deklaruje tolerancji w odniesieniu do chorób lub zaburzeń spowodowanych przez szkodniki.

WRAŻLIWOŚĆ

Niezdolność odmiany do ograniczenia wzrostu i rozwoju określonego szkodnika lub patogenu.

IMMUNNOŚĆ

- odporność całkowita z ang. immunity

Brak podatności na atak lub infekcję danego szkodnika lub patogenu. Seminis nie deklaruje immunności dla żadnego ze swoich produktów.

Należy zauważyć, że na poziom odporności odmiany na szkodniki lub patogeny mają wpływ różnorodne czynniki takie jak: wiek żywiciela, wirulencja patogenów oraz niesprzyjające warunki środowiska. Nowe i/lub a typowe szkodniki lub biotypy patogenów, rasy lub szczepy mogą przezwyciężyć dotychczasową odporność, czasami zupełnie. Odmiany wrażliwe mogą uniknąć ataku patogenów lub szkodników, dzięki utrzymywaniu się warunków środowiska niesprzyjających rozwojowi chorób lub aktywności szkodników.

SPIS TREŚCI

CEBULA

STR. 4

CEBULA ŻÓŁTA

UTOPIA F1 STR. 4

EXACTA F1 **NOWOŚĆ** STR. 4

GOLDEN SPIKE F1 **NOWOŚĆ** STR. 4

VARES F1 **NOWOŚĆ** STR. 5

COLUMBIA F1 **NOWOŚĆ** STR. 5

DINARO F1 STR. 8

STARITO F1 STR. 5

BENNITO F1 **NOWOŚĆ** STR. 5

NARVITO F1 STR. 6

CEBULA BIAŁA STR. 6

ORIZABA F1 **NOWOŚĆ** STR. 6

STERLING F1 STR. 6

CEBULA CZERWONA STR. 7

FIREBALL F1 STR. 7

CEBULA ZIMUJĄCA STR. 7

GLOBE YELLOW DANVERS STR. 7

TINASA F1 STR. 7

BALSTAR F1 STR. 8

CEBULA SZCZYPIOROWA STR. 8

GREEN BANNER STR. 8

MARCHEW

STR. 9

ODMIANY NANTEJSKIE

STR. 9

INVICTA F1 **NOWOŚĆ** STR. 9

BILBO F1 STR. 9

FRODO F1 **NOWOŚĆ** STR. 10

RS 4420206 F1 **NOWOŚĆ** STR. 12

CARAZZO F1 (RS 04472211) **NOWOŚĆ** STR. 12

NEBULA F1 STR. 10

ODMIANY TYPU FLAKKEE STR. 11

CARBETA F1 **NOWOŚĆ** STR. 11

FLAKKESE 2-FLACORO STR. 12

ODMIANY TYPU CHANTENAY STR. 11

ABLEDO F1 STR. 11

ODMIANY CUT & PEEL STR. 12

TASTYPEEL F1 STR. 12

POR

STR. 13

BULGAARSE REUZEN - VARNA STR. 13

ZWITSERSE REUZEN - VERMONT STR. 13

BLAUWGROENE WINTER - ARKANSAS STR. 13

VOLTA F1 **NOWOŚĆ** STR. 14

EINSTEIN F1 STR. 14

NOBEL F1 STR. 16

DAVINCI F1 STR. 14

PASTEUR F1 **NOWOŚĆ** STR. 15

GALVANI F1 **NOWOŚĆ** STR. 15

FAHRENHEIT F1 STR. 15

COUSTEAU F1 **NOWOŚĆ** STR. 16

Wszystkie informacje zawarte w katalogu zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i są oparte na wynikach badań, przeprowadzonych prób oraz doświadczeniu praktycznym. Wszelkie dane liczbowe podano na podstawie wielkości średnich i stanowią one jedynie wartość porównawczą. Seminis nie gwarantuje uzyskania takich samych rezultatów w różnych warunkach klimatyczno-glebowych.

©2008 Seminis Vegetable Seeds. All rights reserved.

**UTOPIA F1****EXACTA F1****GOLDEN SPIKE F1**

1 gram zawiera: 225 - 330 szt. nasion
 Optymalna temp. kiełkowania: 15 - 17°C
 Zagęszczenie: 750 000 - 1 500 000 szt. / ha
 Opakowania: 1 jednostka - 250 000 szt. nasion

CEBULA ŻÓŁTA • • •

UTOPIA F1

Najwcześniejsza odmiana cebuli w asortymencie naszej firmy. Cebula duża, lekko spłaszczona, pokryta jasnożółtą łuską. Posiada jeden stożek wzrostu, osłonięty cienkimi, mięsistymi łuskami. Jest to odmiana przeznaczona na bezpośrednie zaopatrzenie rynku, na cebulę obieraną, do suszenia i mrożenia. UTOPIA F1 posiada umiarkowaną odporność na patogena *Pyrenochaeta terrestris* powodującego różową zgniliznę korzeni.

EXACTA F1

NOWOŚĆ

Bardzo wczesna cebula w typie amerykańskim, rozmiaru jumbo-colossal (bardzo duża). Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem i szybkim wzrostem. Cebule są kuliste, kształtne o cienkiej szyjce, wewnątrz białe i delikatne w smaku. EXACTA F1 jest polecana na zaopatrzenie świeżego rynku na pęczki lub jako cebula obcinana, a także dzięki dużej zawartości suchej masy do przetwórstwa na susz i mrożenie. Wyróżnia się wysoką tolerancją na wybijanie w pędy nasienne oraz na mączniaka rzekomego, a także posiada wysoką odporność na różową zgniliznę korzeni cebuli /*Phoma terrestris*/ oraz wysoką odporność na patogen /*Fusarium oxysporum* f.sp. *Cepea*/ wywołujący fuzaryjną zgniliznę cebuli.

GOLDEN SPIKE F1

NOWOŚĆ

Najnowsza odmiana cebuli w typie amerykańskim, rozmiaru jumbo (duża). Daje wczesny, bardzo wysoki plon dużych cebul, które jednocześnie posiadają mocną łuskę i mogą być przechowywane do marca. GOLDEN SPIKE F1 dojrzewa kilka dni później od najwcześniejszych odmian, a jednocześnie dobrze się przechowuje. System korzeniowy jest silny co pozwala na uzyskanie wysokiego plonu nawet w lata suche. Polecamy tę odmianę do bezpośredniego spożycia od sierpnia do marca i ze względu na wysoki plon do przetwórstwa. Posiada umiarkowaną odporność na patogen /*Fusarium oxysporum* f.sp. *Cepea*/ wywołujący fuzaryjną zgniliznę cebuli, a także jest wysoce tolerancyjny na wybijanie w pędy nasienne.

VARES F1**NOWOŚĆ**

Odmiana nowego typu łącząca w sobie cechy cebuli typu amerykańskiego - dużej i wczesnej, z typem Rijnsburger - o mocnej łusce z możliwością długiego przechowywania. Okres wegetacji to ok. 107 dni od wysiewu. Cebula jest kulista, mocno okryta łuską koloru złotobrazowego ze śnieżnobiałym miąższem. VARES F1 polecamy do wczesnego zbioru i przechowania do kwietnia.

**VARES F1****COLUMBIA F1****NOWOŚĆ**

Nowa odmiana o okresie wegetacji ok. 110 dni. Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem i dużym rozmiarem cebul. Cebula jest kulista, o cienkiej szyjce, złotobrazowej barwie łuski, wyrównana i bardzo twarda. Wewnątrz biała i delikatna w smaku. COLUMBIA F1 posiada mocną łuskę jak na cebulę tak wczesną i można ją przechować ok. 2-3 miesięcy. Odmianę tę polecamy do zbioru wczesnego na cebulę obrzynaną z myślą o sprzedaży na świeży rynek. COLUMBIA F1 wykazuje odporność (IR) na różową zgniliznę korzeni i fuzaryjną zgniliznę cebuli.

**STARITO F1****STARITO F1**

Tworzy duże, kuliste cebule okryte ciemnożółtą łuską, nadające się do długotrwałego przechowywania i wykazujące dużą odporność na przedwczesne pobudzenie podczas przechowywania. Posiada mocny system korzeniowy i wiernie plonuje na różnych stanowiskach glebowych. Ze względu na ciekawą szyjkę i ładny kształt jest uprawiana w gospodarstwach produkujących wysokiej jakości cebulę na eksport jak również stanowi wspaniały surowiec dla przemysłu do przerobu od jesieni do połowy czerwca.

**BENNITO F1****BENNITO F1****NOWOŚĆ**

Nasza najnowsza, późna odmiana typu Rijnsburger do długiego przechowywania. Cebula jest kulista o pięknym jasnym kolorze, cienkiej szyjce i bardzo twarda. Zbiór i załamywanie szczypioru u odmiany BENNITO F1 przypada w tym samym czasie co u dobrze znanej już odmiany NARVITO F1. Z doświadczeń w kilku rejonach Polski wynika, że plon BENNITO F1 jest najwyższy spośród wszystkich naszych odmian typu Rijnsburger. BENNITO F1 wykazuje najdłuższą trwałość w przechowalni i przechowuje się do końca czerwca bez strat.

**NARVITO F1****NARVITO F1**

Późna odmiana typu Rijnsburger z przeznaczeniem na najdłuższe przechowywanie. Okres wegetacji NARVITO F1 to ok. 127 dni. Cebula jest kulista, duża, wyrównana z bardzo mocną łuską o atrakcyjnej złotobrązowej barwie z wysokim połyskiem. Kształt kulisty – lekko wydłużony i cienka szyjka predysponuje tą odmianę do obierania mechanicznego. Plon odmiany NARVITO F1 jest bardzo wysoki, a straty w czasie przechowania do czerwca niewielkie.

CEBULA BIAŁA • • •**STERLING F1****STERLING F1**

Odmiana o pięknej, białej łusce i słodkim, delikatnym smaku. STERLING F1 ma bardzo silny system korzeniowy dzięki temu nawet w niekorzystnych warunkach producenci uzyskują z tej odmiany wysokie plony. Wytwarza bardzo duże o średnicy do 7-10 cm, atrakcyjnie prezentujące się, kuliste cebule, które można przeznaczyć do sprzedaży na świeży rynek jak i do przemysłu na cebulę obieraną. STERLING F1 posiada odporność (IR) na różową zgniliznę korzeni cebuli /Phoma terrestris/ oraz fuzaryjne gnicie cebuli /Fusarium oxysporum f.sp. Cepea/, a także na mączniaka rzekomego.

**ORIZABA F1****ORIZABA F1****NOWOŚĆ**

Odmiana o śnieżno białej łusce kilka dni wcześniejsza od odmiany STERLING F1. Przeznaczona do bezpośredniej sprzedaży na świeży rynek lub do przechowania do wiosny. Nawet po przechowaniu zachowuje piękny biały kolor łuski. Tworzy duże, twarde i mocno okryte łuską cebule. Plon jest wyrównany i wysoki z przewagą cebul o rozmiarze powyżej 7 cm. ORIZABA F1 jest delikatna w smaku i biała w środku. Nie ma tendencji do wybijania w pędy nasienne. Cechuje ją silny system korzeniowy i odporność (IR) na choroby grzybowe - różową zgniliznę korzeni cebuli /Phoma terrestris/ oraz fuzaryjne gnicie cebuli /Fusarium oxysporum f.sp. Cepea/.

CEBULA CZERWONA • • •

FIREBALL F1

Bardzo plenna, pierwsza mieszańcowa odmiana cebuli czerwono - łuskowej do długotrwałego przechowania. Tworzy kuliste, wyrównane cebule o intensywnie czerwonym zabarwieniu łusek. Smak cebuli jest podobny do cebul żółto - łuskowych. Dzięki bardzo wysokiemu udziałowi cebul z jednym stożkiem wzrostu jest polecana do mieszanek sałatkowych. Silny szczypior i mocny system korzeniowy dają gwarancję wysokiego plonu. Długość okresu wegetacji wynosi 125 dni.



FIREBALL F1

CEBULA ZIMUJĄCA • • •

GLOBE YELLOW DANVERS

Odmiana średnio wczesna o bardzo dużej mrozoodporności. Bardzo plenna. Cebula jest osłonięta mocną łuską. Posiada bardzo dobrą polową tolerancję na mączniaka rzekomego i szarą pleśń. Na podstawie wieloletnich doświadczeń określono, że najlepszym terminem siewu jest okres między 10 a 20 sierpnia. Ten termin siewu pozwala na zbudowanie 3-5 liści właściwych przed zimą, czyli najlepszego stadium do przetrzymywania. GLOBE YELLOW DANVERS polecamy na najwcześniejszy zbiór pęczkowy i cebulę obcinaną.



GLOBE YELLOW DANVERS

TINASA F1

Odmiana średnio wczesna, o bardzo dużej mrozoodporności. Bardzo plenna. Cebula jest osłonięta mocną łuską. Tolerancyjna na mączniaka rzekomego i szarą pleśń. Na podstawie wieloletnich doświadczeń określono, że najlepszym terminem siewu jest okres między 10 a 20 sierpnia. Ten termin siewu pozwala na zbudowanie 3-5 liści właściwych przed zimą, czyli najlepszego stadium do przetrzymywania. TINASA jest polecana na najwcześniejszy zbiór pęczkowy i cebulę obcinaną.



TINASA F1

CEBULA SZCZYPIOROWA • • •

GREEN BANNER

Cebula szczypiorowa, do zbioru pęczkowego na świeży rynek. Liście są sztywne, długie, nie rozkładają się na boki są odporne na choroby i wykazują dużą zdrowotność w polu. Okres wegetacji wynosi ok. 90 dni od wysiewu. GREEN BANNER polecamy do najwcześniejszego wysiewu wiosennego pod osłony i do uprawy przez cały sezon w gruncie.



GREEN BANNER

Odmiana	Wegetacja - dni od siewu	Kształt	Barwa łuski	Przechowywanie	Uwagi
Cebula żółta					
Utopia F1	100	spłaszczona	jasnobrązowa	+	najwcześniejsza, nie wybija w pędy nasienne
Exacta F1	103	kulista	jasnobrązowa	+	plenna, do obierania i krótkiego przechowywania
Golden Spike F1	105	kulista	jasnobrązowa	++	bardzo plenna, przechowanie do marca
Vares F1	107	kulista	brązowożółta	++	wczesna, mocna łuska, dobrze się przechowuje
Columbia F1	110	kulista	jasnobrązowa	++	plenna, do obierania i krótkiego przechowywania
Dinaro F1	125	kulista	brązowożółta	+++	bardzo wysoki plon, exportowa jakość
Starito F1	125	kulista	brązowożółta	+++	wierne plonowanie
Bennito F1	127	kulista, lekko wydłużona	brązowożółta	+++	doskonale się przechowuje, rekordowe plony
Narvito F1	127	kulista, lekko wydłużona	brązowożółta	+++	najdłużej się przechowuje, rekordowe plony
Cebula biała					
Orizaba F1	115	kulista	biała	++	wysoki plon, możliwość przechowania do marca
Sterling F1	120	kulista	biała	+	bardzo duża, wysoki plon, delikatny smak
Cebula czerwona					
Fireball F1	125	kulista	czerwono-fioletowa	++	mocna łuska, do przechowywania
Cebula zimująca					
Globe Yellow Danvers	300	kulista	jasnobrązowa	-	duża odporność na mróz, wysoki plon
Balstar F1	300	kulista	jasnobrązowa	-	dobrze zimuje, wysoki, wyrównany plon
Tinasa F1	300	kulista	jasnobrązowa	-	dobrze zimuje, wysoki, wyrównany plon
Cebula szczypiorowa					
Green Banner	55		biała		cebula szczypiorowa do zbioru pęczkowego

1 gram zawiera: 500 - 800 szt. nasion
 Optymalna temp. kiełkowania: 17 - 20°C
 Zagęszczenie: 0,7 - 2 mln szt. / ha
 Opakowania: nasiona kalibrowane
 10 tys. szt., 100 tys. szt.

ODMIANY NANTEJSKIE • • •

INVICTA F1

NOWOŚĆ

Bardzo wczesna odmiana typu nantejskiego, przeznaczona głównie do uprawy na marchewkę pęczkową. Dojrzałość zbiorczą osiąga już po około 85 dniach od siewu uzyskując wyrównane korzenie o długości około 18 cm oraz 2-3 cm grubości szyjki. INVICTA F1 wykształca nać silną i jak na tak wczesną odmianę stosunkowo dużą, pozwalającą łatwo formować pęczki. Kształt korzeni jest zbliżony do nantejskiego z lekko zwężonymi, ale tępo zakończonymi czubkami. Korzenie INVICTY F1 posiadają bardzo gładką skórkę oraz wybarwiają się jednolicie w kolorze ciemnopomarańczowym. INVICTA F1 jest bardzo smaczną marchewką, wyśmienitą do świeżej konsumpcji. Posiada lekko słodki smak i sprawia wrażenie kruchości. W porównaniu do standardowych, populacyjnych odmian marchwi INVICTA F1 odznacza się lepszym wyrównaniem i jakością.

BILBO F1

Bardzo wczesna odmiana z grupy marchwi nantejskich przeznaczona zarówno do sprzedaży pęczkowej jak i bez naci, w tym jako myta, pakowana w tacki lub woreczki foliowe. Dzięki dobrej tolerancji na wytwarzanie pośpiechów BILBO F1 nadaje się do najwcześniejszych wysiewów. Może być wysiewana w kilku terminach, do końca czerwca. Nać, jak na marchew z grupy odmian wczesnych, jest silna, zdrowa, wzniesiona, mało wrażliwa na alternariozę liści. Po 90 dniach od siewu uzyskujemy gładkie, wyrównane, cylindryczne korzenie z dobrze wypełnionymi wierzchołkami o długości około 20 cm. Posiadają one zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz bardzo ładny, jednolity pomarańczowy kolor. Korzenie BILBO F1 są odporne na pękanie i łamanie, a po umyciu prezentują się bardzo atrakcyjnie, mają gładką i błyszczącą skórkę. BILBO F1 posiada wyborny smak oraz wysoką zawartość soków. Podczas prób w Polsce wyróżniała się bardzo niską zawartością azotanów.



INVICTA F1



BILBO F1

**FRODO F1****FRODO F1****NOWOŚĆ**

Odmiana średnio późna, typu nantejskiego o okresie wegetacji około 120 dni, polecana przede wszystkim na bezpośrednie zaopatrzenie świeżego rynku. FRODO F1 osiągająca dojrzałość zbiorczą w październiku może być przechowywana do końca maja. Nać jest silna i zdrowa, posiada umiarkowaną odporność na alternariozę liści (*Alternaria Dauci*) i mączniaka prawdziwego (powdery mliedew) oraz choroby bakteryjne. Odmiana wykazuje wysoką tolerancję na jarowizację. FRODO F1 posiada również umiarkowaną odporność na czarną zgniliznę (*Alternaria Radicina*) i daje wysoki plon zdrowych korzeni o cylindrycznym kształcie, tępo zakończonych, osiągających około 18 cm długości. Korzenie cechuje bardzo duże wyrównanie oraz odporność na pękanie i łamanie podczas zbioru mechanicznego. Charakteryzują się wysoką zawartością suchej masy oraz brakiem tendencji do gromadzenia azotanów. Kolor skórki i miąższu jest intensywnie pomarańczowy, a smak dzięki wysokiej zawartości cukrów bardzo dobry. FRODO F1 to wymarzony produkt do zaopatrzenia supermarketów!

**NEBULA F1****NEBULA F1**

Niezwykłe atrakcyjna, średnio późna odmiana z grupy nantejskich, o okresie wegetacji około 130 dni. Wykształca wysoką, wzniesioną, silną i zdrową nać umożliwiającą łatwy zbiór mechaniczny. NEBULA F1 wykazuje tolerancję połową na alternariozę liści (*Alternaria dauci*) oraz czarną zgniliznę korzeni marchwi (*Alternarię radici*). Korzenie są mocne, bardzo wyrównane, gładkie, dobrze wypełnione na wierzchołku, odporne na pękanie podczas zbioru i mycia. Miąższ długo zachowuje piękną, ciemno pomarańczową barwę, o nie różniącym się odcieniu rdzenia i kory. Dobry smak i wysoka zawartość suchej masy to bezsporne zalety tej marchwi. Najbardziej cenione cechy NEBULI F1 to bardzo dobra tolerancja na tworzenie pośpiechów, wysoka plenność oraz wierność plonowania na różnych stanowiskach glebowych, a także wyjątkowa zdolność do długotrwałego przechowywania. Przechowuje się bez strat do czerwca nawet w tradycyjnych kopcach i przechowalniach, utrzymując jednocześnie swoje parametry użytkowe. NEBULA F1 jest szczególnie rekomendowana jako surowiec do produkcji soków, zwłaszcza po przechowaniu w miesiącach wiosennych.

ODMIANY CHANTENAY • • •

ABLEDO F1

Jest nową odmianą mieszańcową z grupy Chantenay przeznaczoną dla przemysłu. Jak na odmianę w typie Chantenay osiąga dojrzałość stosunkowo wcześnie bo już około 110 dni od wysiewu. Wykształca mocną, ciemnozieloną nać krępo osadzoną na nasadzie korzenia. Wykazuje dobrą odporność na tworzenie pośpiechów. Wytwarza korzenie o kształcie lekko stożkowym, tępo zakończone osiągające w zależności od gęstości wysiewu i typu ziemi długość 16-18 cm i grubość 4-5 cm. Istotne parametry będące charakterystyczne dla tej odmiany to wysoki poziom beta-karotenu, wysoki procent uzyskiwanego soku charakteryzującego się jednocześnie wysokim Brix'em oraz wysoką zawartością witaminy A. ABLEDO F1 jest odmianą praktycznie w ogóle nie kumulującą azotanów, co zostało potwierdzone w różnych warunkach uprawowych.



ABLEDO F1

ODMIANY TYPU FLAKKEE • • •

CARBETA F1

NOWOŚĆ


Bardzo plenna odmiana z grupy Flakkee, o wyraźnie lepszym wybarwieniu korzenia niż inne odmiany, osiągająca dojrzałość zbiorczą po około 145 dniach od wysiewu. Wykazuje dużą odporność na tworzenie pośpiechów i posiada bardzo silną, zdrową nać umożliwiającą łatwy zbiór mechaniczny. Korzenie są gładkie, stożkowe o długości 22-26 cm i średnicy od 3 do 4,5 cm w zależności od gęstości wysiewu oraz rodzaju stanowiska. U CARBETY występuje brak tendencji do zazielenienia główki zarówno zewnątrz jak i wewnątrz korzenia. Z pośród wszystkich odmian występujących w oficjalnych próbach CARBETA F1 wykazała się najwyższą zawartością beta-karotenu, który przekłada się na jej intensywne wybarwienie wnętrza korzeni. Znakomita tekstura oraz jednolita czerwona barwa miąższu korzeni sprawiają, że CARBETA F1 jest odmianą zapewniającą najwyższej jakości surowiec dla przetwórstwa. Dzięki wysokiej zawartości suchej masy odmiana ta idealnie nadaje się do produkcji mrożonek oraz suszu, zapewniając uzyskanie wysokiej wydajności z surowca. CARBETA F1 wykazała się znacznie niższym poziomem azotanów niż porównywalne przemysłowe odmiany uprawiane w tych samych warunkach.



CARBETA F1

Odmiana	Okres wegetacji (w dniach)	Kształt	Długość korzenia (w cm)	Wysokość naci (w cm)	Zalecana gęstość siewu (w mln/ha)	Przeznaczenie
Odmiany nantejskie						
Invicta F1	85	N-nantejski	18-20	45	1,2-1,8	pęczki, świeży rynek
Bilbo F1	90	N-nantejski	18-20	40	1,2-1,8	pęczki, świeży rynek, przechowanie, soki
Frodo F1	120	N-nantejski	17-19	45	1,2-1,8	świeży rynek, przechowanie, plastry
RS 4420206 F1	120	N-nantejski	20-22	40	1,2-1,8	świeży rynek, przechowanie, plastry
Carrazzo F1 (RS 04472211)	120	N-nantejski	19-20	45	1,2-1,8	świeży rynek, przechowanie, plastry
Nebula F1	125	N-nantejski	20-24	45	1,1-1,5	świeży rynek, przechowanie, plastry, soki
Odmiany typu Flakkee						
Carbeta F1	145	F-flakkee	22-28	55	0,7-0,9	susz, mrożenie, soki
Flakkese 2-Flacoro	130	F-flakkee	22-25	55	0,7-0,9	susz, mrożenie, soki
Odmiany typu Chantenay						
Abledo F1	115	C-chantenay	16-20	50	0,6-0,8	soki
Odmiany cut & peel						
Tastypeel F1	120	I-imperator	25-30	45	1,4-2,0	cięcie i pocieranie tzw. cut & peel

Odmiana	Terminy: — siewu — zbioru — przechowywania											
	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
Odmiany nantejskie												
Invicta F1												
Bilbo F1												
Frodo F1												
RS 4420206 F1												
Carrazzo F1 (RS 04472211)												
Nebula F1												
Odmiany typu Flakkee												
Carbeta F1												
Flakkese 2-Flacoro												
Odmiany typu Chantenay												
Abledo F1												
Odmiany cut & peel												
Tastypeel F1												



1 gram zawiera: 250 - 300 szt. nasion
 Optymalna temp. kiełkowania: 18 - 20°C
 Zagęszczenie: 140 000 - 250 000 szt. / ha
 Opakowania:
 - odmiany ustalone: 50 g i 1 kg
 - odmiany heterozyjne: 10 000 szt.

BULGAARSE REUZEN - VARNA

Bardzo popularna odmiana o bardzo długiej łodydze rzekomej, dorastającej nawet do 70 cm długości. Chociaż nie jest ona czysto biała, to jednak dzięki szybkiemu wzrostowi i wysokiemu plonowaniu od dawna stanowi podstawową odmianę do produkcji suszu bądź składnik mieszanek mrożonych warzyw. Szybkie przyrosty powodują, że używana jest również do produkcji przyspieszonej, np. młodych porów wiązanych w pęczki. Dobry surowiec dla potrzeb przemysłu uzyskać można z siewu wprost do gruntu.



BULGAARSE REUZEN - VARNA

ZWITSERSE REUZEN - VERMONT

Szybko rosnąca odmiana o bardzo długiej łodydze rzekomej i sterzących ku górze, ściśle przylegających do siebie liściach. Ze względu na szybki przyrost masy przeznaczona jest do uprawy nie tylko na zaopatrzenie świeżego rynku, ale przede wszystkim na potrzeby przemysłu (suszenie, mrożenie). Bardzo wysoki plon łodyg rzekomych bez tendencji do tworzenia cebulowych zgrubień przy piętce. VERMONT ma wysoką tolerancję na tworzenie pędów kwiatowych i choroby plamistości liści.



ZWITSERSE REUZEN - VERMONT

BLAUWGROENE WINTER - ARKANSAS

Dobrze znana w Polsce i wciąż popularna w Europie, pełna odmiana. Jej sprawdzona mrozoodporność umożliwia zbiór nawet do końca kwietnia. Łodygi rzekome są dość długie ze wzniesionymi ku górze, ciemno zielonymi liśćmi z niebieskim nalotem. ARKANSAS długo zachowuje w gruncie zdrowy wygląd i łatwo rozpoczyna wegetację wiosną po zimowaniu w gruncie. Późno, bo dopiero pod koniec maja rozpoczyna tworzenie pędów nasiennych. Odmiana polecana do zbioru późną jesienią, zimą lub wczesną wiosną. Ze względu na pokrój liści może być zbierana mechanicznie.



BLAUWGROENE WINTER - ARKANSAS

**VOLTA F1****VOLTA F1****NOWOŚĆ**

Najwcześniejsza odmiana o genetycznie dużych nasionach i bardzo szybkich wschodach polecana do uprawy przyspieszonej. Dzięki bardzo szybkim i wyrównanym wschodom można znacznie skrócić okres produkcji rozsady. Wzrost roślin jest bardzo szybki co powoduje, że zbiór można przeprowadzać wcześniej niż w przypadku innych odmian. Liście są wzniesione do góry, silne i ciemno zielone, a część wybielona osiąga długość powyżej 30 cm.

**EINSTEIN F1****EINSTEIN F1**

Bardzo wczesna odmiana heterozyjna w naszej ofercie. Polecana do uprawy przyspieszonej w tunelach, pod włókniną i w gruncie oraz do sprzedaży na świeżym rynku. EINSTEIN F1 wykazuje bardzo wysoką tolerancję na jarowizację. Wyróżnia się szybkim wzrostem, wysokim plonem i długo zachowuje zdrowy wygląd w polu. Kolor liści jest atrakcyjnie ciemno zielony, łodyga biała osiąga długość 27-30 cm.

**DAVINCI F1****DAVINCI F1**

Najlepsza odmiana mieszańcowa z grupy jesiennych. Daje rekordowe plony. Łodyga jest biała i bardzo długa, nawet do 35 cm części wybielonej. Granica pomiędzy częścią białą a ciemnozielonymi liśćmi jest bardzo wyraźna i krótka. DAVINCI F1 polecamy na świeży rynek z myślą o eksporcie jako produkt najwyższej klasy. W krajach zachodniej Europy z powodzeniem uprawiana jest z przeznaczeniem na zaopatrzenie przemysłu (mrożenie, suszenie itp.) ze względu na uzyskiwane wyższe i bardziej wyrównane plony niż z odmian ustalonych. Ta rewelacyjna odmiana bardzo dobrze się przechowuje nawet w prymitywnych kopcach ziemnych i ma wysoką tolerancję na mróz.

FAHRENHEIT F1

Późna odmiana heterozyjna, zimująca w gruncie. Polecamy wysadzanie rozsady w czerwcu. Dzięki dużej tolerancji na wybijanie w pędy kwiatowe zbiór możliwy jest do końca maja. FAHRENHEIT F1 ma długą część wybieloną łodygi, mocne, zdrowe, z grubym nalotem woskowym liście i brak skłonności do tworzenia zgrubienia cebulowego. Wykazuje wysoką tolerancję polową na alternariozę cebuli /alternaria porri/ oraz na rdzę pora /Puccinia porri/. Cechuje ją najwyższa mrozoodporność tak jak u odmiany ARKANSAS.



FAHRENHEIT F1

GALVANI F1

NOWOŚĆ

Odmiana na zbiór jesienny i późnojesienny o grubej i długiej łodydze do 27 cm. Pokrój roślin ze sterzcącymi ku górze liśćmi, ich barwa i wyrównanie są wzorcowe. GALVANI F1 charakteryzuje się dużą zdrowotnością, wykazuje wysoką tolerancję polową na alternariozę cebuli /alternaria porri/ i zachowuje długo trwałość w polu oraz świeżość po zbiorze. Przygotowanie porów do sprzedaży jest szybkie i łatwe zaś sam produkt końcowy prezentuje się doskonale. GALVANI F1 ma genetycznie duże nasiona i szybciej wschodzi od odmian standardowych.



GALVANI F1

Odmiana	zimotrwałość	kolor
Odmiany o cechach ustalonych		
Bulgarese Reuzen - Varna	-	zielony
Zwitserse Reuzen - Vermont	+	zielony
Blauwgroene Winter - Arkansas	+++	niebieskozielony
Odmiany heterozyjne		
Volta F1	-	zielony
Einstein F1		ciemnozielony
Nobel F1	-	zielony
Davinci F1	-	ciemnozielony
Pasteur F1	++	ciemnozielony
Galvani F1	+++	niebieskozielony
Fahrenheit F1	+++	niebieskozielony
Cousteau F1	+++	niebieskozielony

Odmiana	Wczesność	Pokrój liści	Tolerancja na choroby	Łodyga rzekoma			Przeznaczenie			Uwagi
				długość (w cm)	cebula	trwałość w polu	rynek	przetwórstwo	suszenie	
Odmiany o cechach ustalonych										
Bulgarese Reuzen - Varna	bardzo wczesna	9	5	50-70	7	7	+	+++	+++	długa łodyga rzekoma, duża sucha masa
Zwitserse Reuzen - Vermont	bardzo wczesna	6	6	26-32	7	8	+++	+++	+++	bardzo wysoki plon, do wczesnych upraw, również do siewu wprost do gruntu
Blauwgroene Winter - Arkansas	późna	7	8	20-25	7	9	+++	+	+	wysoki plon i mrozoodporność zbiór do maja, szybki wzrost zimą
Odmiany heterozyjne										
Volta F1	bardzo wczesna	7	8	26-32	7	6	+++	++	+	genetycznie duże nasiona i szybkie wschody
Einstein F1	bardzo wczesna	6	8	26-28	7	6	+++	++	+	do upraw przyśpieszonych, tolerancja na pośpiechy, wysoki plon
Nobel F1	bardzo wczesna	6	8	26-28	7	6	+++	++	+	do upraw przyśpieszonych, tolerancja na pośpiechy, wysoki plon
Davinci F1	wczesna	8	8	26-30	7	9	+++	+++	++	długo w polu, bardzo wysoki plon, również do siewu wprost do gruntu
Pasteur F1	średnio wczesna	7	8	26-28	8	8	+++	++	+	znakomity produkt na świeży rynek
Galvani F1	średnio wczesna	8	8	26-28	7	8	+++	++	+	bardzo szybkie wschody, bardzo wyrównany plon, świeży rynek
Fahrenheit F1	późna	7	9	22-25	7	9	+++	+	+	wysoka mrozoodporność, zbiór w maju, tolerancja na wybijanie w pędy
Cousteau F1	późna	7	8	24-27	7	9	+++	+	+	wysoka mrozoodporność, bardzo długa część wybielona

OBJAŚNIENIA:

- wyższa liczba oznacza bardziej wzniesione liście, większą tolerancję polową na choroby, mniejszą cebulę, większą odporność na starzenie się w gruncie.

LICZBA ROŚLIN NA 1 M² PRZY RÓŻNYM ZAGĘSZCZENIU

w cm	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	125	150
10	100,00	66,66	50,00	40,00	33,33	25,00	20,00	16,66	14,28	12,50	11,11	10,00	8,00	6,66
15	66,66	44,44	33,33	26,66	22,22	16,66	13,33	11,11	9,42	8,33	7,40	6,66	5,33	4,44
20	50,00	33,33	25,00	20,00	16,66	12,50	10,00	8,33	7,14	6,25	5,55	5,00	4,00	3,33
25	40,00	26,66	20,00	16,00	13,33	10,00	8,00	6,66	5,71	5,00	4,44	4,00	3,19	2,66
30	33,33	22,22	16,66	13,33	11,11	8,33	6,66	5,55	4,76	4,16	3,70	3,33	2,66	2,22
35	28,57	19,05	14,28	11,43	9,52	7,14	5,71	4,76	4,08	3,57	3,17	2,86	2,28	1,90
40	25,00	16,66	12,50	10,00	8,33	6,25	5,00	4,16	3,57	3,12	2,77	2,50	2,00	1,66
45	22,22	14,81	11,11	8,89	7,40	5,56	4,44	3,70	3,17	2,78	2,47	2,22	1,78	1,48
50	20,00	13,33	10,00	8,00	6,66	5,00	4,00	3,33	2,85	2,50	2,22	2,00	1,60	1,33
55	18,18	12,12	9,09	7,27	6,06	4,54	3,63	3,03	2,59	2,27	2,02	1,82	1,45	1,21
60	16,66	11,11	8,33	6,66	5,55	4,16	3,33	2,77	2,38	2,08	1,85	1,66	1,33	1,11
65	15,38	10,26	7,69	6,15	5,13	5,85	3,08	2,56	2,20	1,92	1,71	1,54	1,24	1,03
70	14,28	9,42	7,14	5,71	4,76	3,57	2,85	2,38	2,04	1,78	1,58	1,42	1,14	0,95
75	13,33	8,89	6,67	5,48	4,44	3,33	2,67	2,22	1,90	1,67	1,48	1,33	1,07	0,89
80	12,50	8,33	6,25	5,00	4,16	3,12	2,50	2,08	1,78	1,56	1,38	1,25	1,00	0,83
90	11,11	7,40	5,55	4,44	3,70	2,77	2,22	1,85	1,58	1,38	1,23	1,11	0,88	0,74
100	10,00	6,66	5,00	4,00	3,33	2,50	2,00	1,66	1,42	1,25	1,11	1,00	0,80	0,66
120	8,33	5,56	4,17	3,33	2,78	2,08	1,67	1,36	1,19	1,04	0,92	0,83	0,67	0,56
125	8,00	5,33	4,00	3,19	2,66	2,00	1,60	1,33	1,14	1,00	0,88	0,80	0,64	0,53
150	6,66	4,44	3,33	2,66	2,22	1,66	1,33	1,11	0,95	0,83	0,74	0,66	0,53	0,44

ZASADY PRZECHOWYWANIA I POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁEM SIEWNYM

Nasiona, jako organizmy żywe, muszą być przechowywane i traktowane w odpowiedni sposób, w przeciwnym wypadku znacznie obniża się ich żywotność. Seminis zaleca wysiew materiału siewnego przed datą ważności podaną na opakowaniach, poniższe informacje dodatkowo pomogą zapewnić jak najdłuższy okres przydatności do siewu.

TEMPERATURA

Wysoka temperatura i wilgotność mogą przyczynić się do redukcji wigoru i zdolności kiełkowania nasion, dlatego materiał siewny powinien być przechowywany w chłodnych i suchych pomieszczeniach oraz w hermetycznych opakowaniach, z dala od promieni słonecznych. Seminis zapewnia pakowanie nasion w sposób umożliwiający zachowanie znormalizowanej, optymalnej wilgotności materiału, dlatego też należy utrzymać szczelność przechowywanych opakowań, aby uchronić nasiona przed ich zawilgoceniem, co skutkuje ich uszkodzeniem. Nasiona niezaprawiane lub zaprawiane fungicydem zaleca się przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 15°C, natomiast materiał zaprawiany insektycydem lub podkiełkowany powinien być przechowywany w temperaturze 5°C lub niższej. Zazwyczaj obniżenie temperatury średnio o 5°C pozwala dwukrotnie przedłużyć okres przydatności nasion do siewu.

NASIONA POBUDZONE DO KIEŁKOWANIA

Materiał siewny może być oferowany również w postaci nasion pobudzonych do kiełkowania. Proces pobudzania nasion przyspiesza właściwy moment kiełkowania nasion i pomaga w uzyskaniu wyrównanych wschodów, zwłaszcza w mniej korzystnych, stresowych warunkach. Nasiona pobudzone powinny zostać wysiane w tym samym roku, w którym poddano je procesowi pobudzania, ponieważ proces ten skraca okres ich przydatności do siewu. Seminis zaleca przechowywanie nasion pobudzonych w temperaturze 5°C. W przypadku przechowywania tych nasion przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od momentu ich pobudzenia, należy przed siewem wykonać badanie zdolności kiełkowania, które następnie należy powtarzać co 3 miesiące, każdorazowo przed ich wysiewem.

TRANSPORT MATERIAŁU SIEWNEGO

Podczas transportu należy zapewnić warunki identyczne jak przy normalnym magazynowaniu nasion, szczególnie jeśli chodzi o temperaturę oraz wilgotność powietrza. Również przy załadunku i rozładunku należy unikać sytuacji, w których materiał siewny mógłby zostać narażony na bezpośrednie nasłonecznienie lub znaleźć się w pobliżu źródeł ciepła.

POSTĘPUJ Z NASIONAMI OSTROŻNIE

Przez niewłaściwe postępowanie materiał siewny może zostać uszkodzony. Nasiona posiadają twardą, lecz jednocześnie kruchą zewnętrzną okrywą nasienną, która bezpośrednio chroni żywy organizm nasiona. Nasiona kukurydzy, grochu i fasoli są szczególnie wrażliwe na uszkodzenie przy niewłaściwym traktowaniu. Worki z tym materiałem siewnym nie powinny być rzucane, ponieważ w osłonie i zarodku nasiona może powstać pęknięcie, w wyniku którego nie będzie się ono rozwijać prawidłowo.

BADANIE ZDOLNOŚCI KIEŁKOWANIA

Seminis zaleca, aby każda partia nasion była poddana co 6 miesięcy badaniu na zdolność kiełkowania (co trzy miesiące nasiona pobudzone - patrz wyżej). Badanie takie powinno być wykonane w laboratorium stosującym procedury ISTA lub innym przestrzegającym regulacje obowiązujące w danym kraju bądź uznane na świecie.



OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NASION MONSANTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży nasion, zwane dalej warunkami sprzedaży, mają zastosowanie do każdej oferty (zamówienia) lub umowy sprzedaży nasion zawartej pomiędzy Monsanto Polska Sp. z o.o. lub jej upoważnionego przedstawiciela, zwanych dalej Monstanto, a kontrahentami w Polsce (Kupujący), o ile strony transakcji inaczej nie postanowiły.

2. Warunki sprzedaży regulują zakupy w Monsanto nasion dla celów związanych z działalnością gospodarczą, jak również dla celów z tą działalnością niezwiązanych.

3. Nasiona zakupione w Monsanto są przeznaczone do uprawy roślin na konsumpcję lub paszę albo na inne cele gospodarcze. Nie mogą być jednak używane do pozyskiwania nowego materiału siewnego.

OFERTA NASION

1. Wykaz nasion oferowanych przez Monsanto do sprzedaży zawarty jest każdorazowo w aktualnym cenniku nasion, ustalonym odrębnie na każdy sezon sprzedaży (od 1 września do 31 sierpnia następnego roku). Monsanto zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w cenniku w okresie jego obowiązywania, jeżeli będzie to podyktowane nadzwyczajnymi zdarzeniami nie zależnymi od Monsanto, których nie można było przewidzieć przy ustalaniu cennika.

2. Cennik nasion zawiera podstawową specyfikację oferowanych nasion oraz ich cenę za opakowanie jednostkowe lub jednostkę wagi. Cena nasion obowiązuje w miejscu siedziby Monsanto i zawiera koszt oryginalnego opakowania standardowego.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedaż nasion odbywa się na podstawie złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem odrębności regulacji przy sprzedaży bezpośredniej i pośredniej.

2. Zamówienie zawierać powinno specyfikację nasion, zgodnie z ich cennikiem (4) oraz ilość zamawianych nasion w poszczególnych asortymentach.

§6. Monsanto może zastrzec, że zamówienie będzie przyjęte do realizacji pod warunkiem przedłożenia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego tożsamość Kupującego lub fakt prowadzenia działalności gospodarczej (od pis z rejestru, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON, Nr konta bankowego itp.)

§7. Potwierdzeniem otrzymania przez Kupującego nasion jest odpowiedni dokument wydania lub wysyłki nasion albo pisemne potwierdzenie na rachunku.

§8. Zamówienia nasion realizowane są niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia. Monsanto jest upoważniona do odstąpienia od niezwłocznej realizacji zamówienia, gdy nie będzie dysponowała odpowiednią ilością nasion do jego realizacji. Monsanto poinformuje Kupującego o wystąpieniu takiej sytuacji w formie ogólnodostępnej dla stron (telefonicznie, telefaksem itp.) oraz wyznaczy przybliżony termin realizacji zamówienia.

§9. W przypadku uzyskania informacji o takim pogorszeniu się sytuacji finansowej Kupującego, że jego wypłacalność jest osłabiona, Monsanto jest uprawniona do bezzwłocznego wstrzymania realizacji zamówień w systemie kredytowania.

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

§10.1. Sprzedaż bezpośrednia nasion odbywa się w siedzibie Monsanto oraz innych miejscach wskazanych jako placówki Monsanto, w godzinach ich normalnego funkcjonowania.

2. Kupujący przy sprzedaży bezpośredniej może składać zamówienie ustnie lub pisemnie. W przypadku, gdy łączna cena zamówionych nasion wyklucza rozliczenie gotówkowe, Kupujący zobowiązany jest złożyć zamówienie w formie pisemnej lub dokonać 100% przedpłaty na konto bankowe Monsanto.

3. Jeżeli zamówienie nie obejmuje większą ilość nasion, jego realizacja może być przez Monsanto wyznaczona na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu złożenia zamówienia. Strony transakcji mogą uzgodnić również inny termin realizacji zamówienia.

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

§11.1. Zamówienia do realizacji sprzedaży wysyłkowej składane są na piśmie (w formie listownej, telefaksowej, telegraficznej).

2. Monsanto zobowiązuje się do dostarczania nasion do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu. Koszty dostarczenia nasion obciążają Kupującego.

3. Dostawa nasion następować będzie pocztą, w formie przesyłek kurierskich, pośłańcem bezpośrednio do rąk Kupującego lub w inny sposób uwzględniony przez strony na piśmie.

ROZLICZENIA FINANSOWE

§12.1. Monsanto zastrzega sobie możliwość wprowadzenia każdorazowo różnych form płatności za nasiona. W szczególności Monsanto może udzielać kredytu kupieckiego, pobierać zaliczki, zadatki, a także ustalać wszelkie dopuszczalne prawnie zabezpieczenia płatności.

2. Należności za nasiona są płatne bez pośrednio w kasie siedziby Monsanto lub zgodnie z obowiązującymi przepisami na konto Monsanto w Banku Handlowym w Warszawie S.A. III Oddział Warszawa Nr konta 10301032-08739301.

3. Szczegółowe warunki płatności są każdorazowo zawarte w rachunku, a w razie żądania przez Monsanto przedpłaty - w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

§13. W przypadku zwłoki w płatnościach należności Monsanto ma prawo naliczyć odsetki ustawowe, które Kupujący jest zobowiązany zapłacić.

§14. Zastrzeżenia do rachunków wystawionych przez Monsanto Kupujący zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Kupujący jest zobowiązany każdorazowo sprawdzić prawidłowość realizacji zamówienia, a w szczególności czy ilość i asortyment nasion odpowiadają zamówieniu Kupującego.

2. Reklamację co do niezgodności ilościowych realizacji zamówienia przy sprzedaży w siedzibie Monsanto powinny być składane przez Kupującego wyłącznie bezpośrednio przy odbiorze nasion.

3. Reklamację co do niezgodności ilościowych oraz ewentualne widoczne wady nasion przy sprzedaży pośredniej (wysyłkowej) Kupujący jest zobowiązany zgłosić Monsanto niezwłocznie po ich stwierdzeniu nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty odbioru.

§16.1. Zgłaszając wady ukryte nasion Kupujący jest zobowiązany podać ustnie i pisemnie datę realizacji zamówienia i numer dowodu sprzedaży. Do zgłoszenia będzie dołączone każdorazowo oryginalne opakowanie reklamowanych nasion z widocznymi numerami ewidencyjnymi.

2. Do reklamacji na piśmie dołączyć należy dowody potwierdzające wady ukryte nasion (np. oświadczenia świadków) oraz szczegółowy opis postępowania z nasionami w okresie od ich zakupu do ujawnienia wady i zgłoszenia reklamacji. Reklamacja powinna być udokumentowana w sposób nie budzący zastrzeżeń Sprzedającego lub niezależnego rzeczoznawcy.

§17. Monsanto odpowiada wyłącznie za wady ukryte nasion sprzedane w oryginalnych opakowaniach, jeśli zostały zgłoszone w okresie 30 dni od daty ich wykrycia.

§18.1 W razie uznania reklamacji Monsanto ponosi odpowiedzialność materialną do wysokości wartości reklamowanych nasion.

2. Odpowiedzialność Monsanto nie obejmuje poniesionych nakładów i utraconych korzyści przez Kupującego.

§19.1. Monsanto nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:

a) Kupujący postępował z nasionami niezgodnie z odpowiednimi zaleceniami;

b) nasiona były przepakowane bez wiedzy Monsanto;

c) nasiona były przechowywane w nieodpowiednich warunkach;

d) wystąpiła siła wyższa.

§20. W przypadku wniesienia reklamacji i braku jej bezzwłocznego przyjęcia przez Monsanto każda ze stron ma prawo powołać się na wynik badania jakości reklamowanych nasion. Badania przeprowadzi wskazana przez Monsanto Stacja Oceny Nasion, zrzeszona w organizacji I.S.T.A. Wynik tego badania jest wiążący dla stron. Monsanto obciążają koszty badania wyłącznie w przypadku wykrycia wad nasion. W pozostałych przypadkach koszty badań pokrywa składający reklamację.

SPRZEDAŻ NASION DLA CELÓW NIEZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Do sprzedaży nasion dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą stosu je się warunki sprzedaży, chyba że obowiązujące przepisy, a w szczególności Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (Dz. U. z1995 r. Nr 64. poz. 328. ze zmianami) stanowią inaczej.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Strony powinny dążyć, aby wszelkie spory między nimi rozstrzygane były polubownie.

2. Monsanto przysługuje prawo poddania sporu do rozstrzygnięcia przez Międzynarodową Organizację Nasienną - F.I.S.

3. W przypadku nie możliwości znalezienia ugodowego rozwiązania, spór taki będzie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Monsanto.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23. Wszelkie znaki towarowe umieszczone na opakowaniach, katalogach, instrukcjach, materiałach reklamowych itp. pozostają własnością Monsanto i nie mogą być użyte bez jej zgody.

§24. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami ogólnymi warunków sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy.

Seminis®

MONSANTO POLSKA SP. Z O.O.
BIURO HANDLOWE SEMINIS
ul. Dywizjonu 303 nr 169, 01-470 Warszawa
tel.: (022) 638 25 86, fax: (022) 638 25 22
www.seminis.com.pl



A division of MONSANTO

